


Насекомые — Insecta

**Поденка сходножилковая  
Вернера**  
*Paraleptophlebia weneri*  
(Ulmer, 1919)

**Семейство**  
*Подёнки грязевые —*  
*Caenidae*  
**Статус 3**



**Распространение**

В мире: Западная Европа, восточный Казахстан. В России: вся Европейская часть, кроме юго-запада, Западная Сибирь. В Республике Коми: в реках Печора, Вычегда, Косью, Подчерье.

**Места обитания и биология**

Личинки обитают в реках, ручьях, озерах и болотах пойм. Они имеют стройное веретеновидное тело с 7 парами нитевидных жабр, ветвящихся почти у основания, с длинными хвостовыми нитями. Живут на дне водоемов, могут мигрировать в речном потоке, питаются детритом и водорослями, сами служат пищей рыб. Крылатые стадий две (субимаго и имаго). Взрослые особи летают над поверхностью воды и вдоль берегов.

**Краткое описание взрослой стадии**

Длина взрослых особей: самца – 4.5-7, самки – 5.5-8 мм. Имаго имеет две пары крыльев, три желтоватые хвостовые нити одинаковой длины. Брюшко с четырьмя просвечивающими сегментами. Ноги коричневатые, лапки несколько светлее.

**Численность на территории Республики Коми**

Редкий вид, распространен локально, данные о численности отсутствуют

**Лимитирующие факторы и угрозы**

Промышленное и бытовое загрязнение водоемов.

**Принятые и необходимые меры охраны**

Контроль состояния природных популяций,

сохранение среды обитания, охрана популяций на ООПТ.

**Статус вида на территории Российской Федерации и соседних субъектов Российской Федерации**

Вид включен в Красную книгу Карелии (статус 4).

*Литература. Чернова, 1940; Определитель....., 1964; Седых, 1974; Limnofauna....., 1978; Новикова, 1984; Определитель....., 1997.*

*Составитель. О.А. Лоскутова.*

*Художник. Е.Б. Фефилова*

*Источники информации. Сборы составителя*