



## Насекомые — Insecta

**Зигимус нигрицепс**  
*Zygimus nigriceps*  
 (Fall&#233;n, 1829)

**Семейство**  
 Слепняки — *Miridae*  
**Статус 3**

**Краткое описание взрослой стадии**

Нежный, с мягкими покровами тела клоп. Голова, переднеспинка, грудь, основание щитка черные. Щиток, надкрылья и брюшко светло-зеленого цвета. Перепоночка бурая. Усики ржавые или зеленоватые. Хоботок желтый, на конце черный. Ноги без пятен. Половой диморфизм не выражен. Размеры тела варьируют от 4 до 4.5 мм.

**Распространение**

В мире: Великобритания, Швеция, Норвегия, Республика Беларусь. В России: Ярославская и Пермская области, юго-западная и центральная Якутия, Хабаровский край. В Республике Коми известен по находкам со Среднего Тимана (бассейн реки Белая Кедва, долины ручьев Изъель и Косэшмес).

**Места обитания и биология**

Характерен для склонов останцев, карстовых суходольных лугов, первичных березняков, смешанных сосново-лиственных лесов. Имаго развивается и обитает на можжевельнике, возможно монофитофаг. Дает одно поколение в год, зимуют яйца. Имаго нового поколения появляются в начале июля.

**Численность на территории Республики Коми**

Численность низкая, встречается локально.

**Лимитирующие факторы и угрозы**

Изменение условий обитания вида, антропогенное воздействие, влияющие на кормовое растение клопа. Вид является индикатором естественных, ненарушенных таежных экосистем.

**Принятые и необходимые меры охраны**

Ключевые местообитания вида сохраняются в заказнике «Белая Кедва».

**Статус вида на территории Российской Федерации и соседних субъектов Российской Федерации**

**Федерации**

В сопредельных регионах не охраняется.

*Источники информации. Коллекции ЗИН РАН (Санкт-Петербург), Института биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар)*

*Составитель. А.Н. Зиновьева*

*Литература. Кириченко, 1951; Кержнер, Ячевский, 1964; Винокуров, Канюкова, 1995; Kerzhner & Josifov, 1999; Энтомофауна..., 2007.*

*Художник. А.Е. Бринев*